



للتواصل الإعلامي: Kim Junius
ccdphmedia@cookcountyhhs.org

للنشر الفوري
04/15/24

مقاطعة كوك تؤكد حالة الحصبة الثانية

يحذر مسؤولو الصحة من التعرض المحتمل للحصبة في سيسيرو. الحالة ليس لها رابط معروف بتجمع شيكاغو.

أبلغ مسؤولو إدارة الصحة العامة في مقاطعة كوك (CCDPH) عن ثاني حالة مؤكدة للإصابة بالحصبة في ضواحي مقاطعة كوك هذا العام. الحالة المكتسبة من المجتمع هي مقيم بالغ غير ملقح. لا توجد صلة معروفة بالحالات الأخيرة المرتبطة بمأوى للمهاجرين في شيكاغو. حتى اليوم، هناك 64 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في إلينوي، وفقًا لإدارة الصحة العامة في إلينوي.

قضى الفرد بعض الوقت في سوبر ميركادو توريس في 5310 غرب شارع 25، شيشرون، إلينوي 60804، بين 6 أبريل و 10 أبريل 2024، أثناء إصابته بفيروس الحصبة. قد يكون أي شخص قضى وقتًا في هذا الموقع خلال التواريخ والأوقات التالية قد تعرض للحصبة:

4/6: 7 صباحًا - 4 مساءً

4/7: 12 مساءً - 9 مساءً

4/9: 9 صباحًا - 6 مساءً

4/10: 11 صباحًا - 3:30 مساءً

"يجب أن يعرف الأشخاص الذين زاروا السوق في هذه الأيام أنهم على الأرجح في مأمن من الإصابة بالحصبة إذا تلقوا سابقًا جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. وقال الدكتور لامار هاسبروك، الرئيس التنفيذي للعمليات في CCDPH: "إذا لم يتم تطعيمهم أو كانوا يعانون من أعراض الحصبة، فيجب عليهم الاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور لترتيب التقييم الطبي". "نحن نعمل على تحديد أي أماكن إضافية قد يكون التعرض للحصبة قد حدث فيها من خلال تحقيقنا الوبائي المستمر."

الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو إصابتهم سابقًا معرضون لخطر الإصابة بالحصبة. معظم الأطفال مؤهلون لتلقي الجرعة الأولى من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في عمر 12 شهرًا. من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين ولدوا قبل عام 1957 قد أصيبوا بالعدوى بشكل طبيعي، وبالتالي يُفترض أنهم محميون من الحصبة.

تشمل أعراض الحصبة الطفح الجلدي وارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف واحمرار العينين. في حالة الإصابة، يمكن أن يصاب الأفراد بأعراض تصل إلى 21 يومًا بعد التعرض ويصبحون معديين للآخرين بدءًا من أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي خلال أربعة أيام بعد ذلك.

يجب على الأفراد، لا سيما أولئك الذين لم يتم تطعيمهم والذين يعتقدون أنهم تعرضوا للحصبة، الاتصال بمقدم الرعاية الصحية قبل الذهاب إلى مكتب طبي أو قسم الطوارئ لترتيب تقييم طبي لن يعرض المرضى الآخرين والموظفين الطبيين لخطر التعرض للحصبة. سيقدم مقدم الرعاية الصحية معلومات إضافية حول اختبار الحصبة والتطعيم. يمكن إعطاء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أو دواء يسمى "الجلوبيولين المناعي" للأفراد المعرضين الذين ليسوا محصنين ضد الحصبة للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالحصبة.

--المزيد--

الحصبة تنتشر بسهولة في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يعطس. الناس يمكن أن يمرضوا أيضًا عندما يتلامسون مع المخاط أو اللعاب من شخص مصاب. يمكن أن تسبب الحصبة **مضاعفات** خطيرة مثل التهاب الرئوي والتهاب الدماغ (تورم الدماغ). الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا هم أكثر عرضة للمعاناة من المضاعفات.

يشجع CCDPH بشدة جميع سكان مقاطعة كوك في الضواحي على مواكبة جميع اللقاحات الموصى بها، بما في ذلك الحصبة. تستطيع سكان إلينوي التحقق من سجلات تطعيماتهم باستخدام بوابة **Vax Verify** الإلكترونية عبر الإنترنت التابعة لإدارة الصحة العامة في إلينوي.

يتم تشجيع الأفراد غير الملقحين الذين ليس لديهم مقدم رعاية صحية على الاتصال بشركة **كوك كاونتي هيلث** على الرقم 1988-308-833 لتحديد موعد للتطعيم في مركز صحي مجتمعي في شيكاغو أو في ضاحية كوك كاونتي.

###