

立即发布  
04/15/24

媒体联系人: Kim Junius  
ccdphmedia@cookcountyhhs.org

## 库克县确认第二例麻疹病例

卫生官员警告，在西塞罗可能存在麻疹接触风险。该病例与芝加哥疫情群聚无已知联系。

库克县公共卫生局（CCDPH）官员报告了今年库克县郊区第二例麻疹确诊病例。社区获得性病例是未接种疫苗的成年居民。最近与芝加哥移民庇护所相关的案件没有已知的联系。根据 [伊利诺伊州公共卫生部](#) 的数据，截至今天，伊利诺伊州有64例麻疹确诊病例。

该个人在2024年4月6日至4月10日期间，在伊利诺伊州西西罗25街5310号的Super Mercado Torres度过时间，并携带麻疹病毒。在以下日期和时间在该地点停留的任何人都可能接触过麻疹：

4/6:上午7点至下午4点  
4/7:中午12点至晚上9点  
4/9:上午9点至下午6点  
4/10:上午11点至下午3点半

“这些天来到市场的人应该知道，如果他们之前接种了两剂MMR疫苗，他们很可能不会患上麻疹。如果他们没有接种疫苗或出现麻疹症状，他们应该立即致电医疗保健提供者安排医疗评估，”CCDPH首席运营官LaMar Hasbrouck博士说。“我们正在通过正在进行的流行病学调查，努力确定可能发生麻疹暴露的任何其他地方。”

未接种疫苗或未曾感染过的人有感染麻疹的风险。大多数儿童在12个月大时有资格接种第一剂MMR疫苗。1957年以前出生的人很可能已经自然感染过麻疹，因此被认为对麻疹具有免疫力。

麻疹的症状 包括皮疹、高烧、咳嗽、流鼻涕和红色、水汪汪的眼睛。如果感染，个体可能在暴露后21天内出现症状，并从皮疹出现前四天开始传染给其他人，直至四天后。

个人，特别是那些认为自己接触过麻疹的未接种疫苗的人，应该在去医疗办公室或急诊室之前联系医疗服务提供者，安排一项不会使其他患者和医务人员面临麻疹暴露风险的医疗评估。医疗保健提供者将提供有关麻疹检测和疫苗接种的其他信息。MMR疫苗或一种名为“免疫球蛋白”的药物可以给予对麻疹没有免疫力的暴露个体，以帮助降低患麻疹的风险。

--更多--

当有人咳嗽或打喷嚏时，麻疹很容易通过空气传播。当人们接触到感染者的粘液或唾液时，也可能会生病。麻疹可引起严重的 [并发症](#)，如肺炎和脑炎（脑肿胀）。5岁以下的儿童和20岁以上的成年人更容易出现并发症。

CCDPH强烈建议所有库克县郊区居民及时接种所有推荐的疫苗，包括麻疹疫苗。伊利诺伊州居民可以使用伊利诺伊州公共卫生部的在线[VAX 验证](#)门户网站查看其免疫记录。

鼓励没有医疗保健提供者的未接种疫苗的个人致电833-308-1988联系 [库克县卫生部](#)，在芝加哥或库克县郊区的社区卫生中心安排疫苗接种预约。

###