

Odra jest poważną chorobą układu oddechowego (płuc i dróg oddechowych). Powoduje wysypkę i gorączkę. Jest bardzo zaraźliwa. W rzadkich przypadkach może być śmiertelna. Odra jest tak zaraźliwa, że 90 procent nieszczepionych osób zachoruje na nią po spotkaniu się z wirusem.



Jakie są objawy odry?

Odra zaczyna się od gorączki, która może być bardzo wysoka. Niektóre z innych objawów, które mogą wystąpić, to:

- Kaszel, katar i zaczerwienienie oczu
- Wysypka w postaci drobnych, czerwonych plamek (zaczyna się na głowie)
- Biegunka
- Infekcja ucha

Czy odra jest poważna?

Odra może być niebezpieczna, szczególnie dla niemowląt i małych dzieci. U niektórych dzieci odra może prowadzić do:

- Zapalenia płuc (ciężka infekcja płuc)
- Trwałego uszkodzenia mózgu
- Głuchoty
- Śmierci



1 na 5 osób zostanie hospitalizowana



Jak rozprzestrzenia się odra?

- Odra rozprzestrzenia się, gdy osoba zarażona wirusem odry oddycha, kaszle lub kicha.
- Odrą można zarazić się przebywając w pomieszczeniu razem z chorą osobą, oraz do 2 godzin po opuszczeniu przez nią pomieszczenia.
- Odrą można zarazić się od osoby zarażonej, zanim jeszcze pojawi się u niej wysypka świadcząca o odrze.
- Prawie każdy, kto nie został zaszczepiony szczepionką MMR, zachoruje na odrę, jeśli zostanie narażony na kontakt z wirusem odry.

W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed odra, świnką i różyczką, lekarze zalecają podanie dzieciom dwóch dawek szczepionki MMR.

Kiedy moje dziecko powinno otrzymać szczepionkę MMR?

Jedna dawka w każdej z następujących grup wiekowych:

1 dawka: 12 - 15 miesięcy

2 dawka: 4 - 6 lat

Przed podróżą do innego kraju, niemowlęta w wieku od 6 do 11 miesięcy powinny otrzymać 1 dawkę szczepionki MMR.

Dlaczego moje dziecko powinno otrzymać szczepionkę MMR?

- Szczepionka chroni dziecko przed odra, potencjalnie poważną chorobą, a także świnką i różyczką.
- Chroni ona dziecko przed nieprzyjemną wysypką i wysoką gorączką, jaką wywołuje odra.
- Chroni również dziecko przed opuszczeniem szkoły lub koniecznością zapewnienia dziecku opieki i nieobecnością rodzica w pracy.

Jakie są skutki uboczne zastrzyku?

Większość dzieci nie odczuwa żadnych skutków ubocznych zastrzyku. Działania niepożądane, które występują, są zwykle łagodne i mogą obejmować:

- Ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania zastrzyku
- Gorączka
- Łagodna wysypka
- Przejściowy ból i sztywność stawów
- Poważniejsze działania niepożądane występują rzadko. Mogą to być wysokie stany gorączkowe, które mogą powodować napady padaczkowe.

Należy przestrzegać kalendarza szczepień

- Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (Centers for Disease Control and Prevention), Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (American Academy of Family Physicians) i Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics) zdecydowanie zalecają, aby dzieci otrzymywały wszystkie szczepionki zgodnie z zalecanym kalendarzem szczepień.
- Uzyskaj listę szczepień, których Twoje dziecko może potrzebować w zależności od wieku, stanu zdrowia i innych czynników.

Szczepionka MMR jest bezpieczna i skuteczna.

- Szczepionka przeciw odrze jest bardzo bezpieczna i skutecznie zapobiega odrze. Szczepionki, jak każdy lek, mogą wywoływać skutki uboczne. Są one zwykle łagodne i ustępują samoistnie.
- Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów dokładnie przebadali szczepionkę MMR. Żaden z nich nie znalazł związku między autyzmem a szczepionką MMR.

Przed, w trakcie i po podaniu szczepionki

Przygotuj się do wizyty na szczepienie swojego dziecka i dowiedz się, jak możesz:

- Sprawdź informacje o szczepionce i przygotuj dziecko przed wizytą
- Pocieszaj swoje dziecko podczas wizyty
- Opiekuj się dzieckiem po podaniu szczepionki



Cook County
DEPT. of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES