

# 麻疹 情况说明书



Cook County  
DEPT.  
of  
Public Health

**BUILDING**  
**HEALTHIER**  
**COMMUNITIES**

麻疹是一种严重的呼吸道疾病（发生在肺部和呼吸道中）  
它会引起皮疹和发烧。  
它具有很强的传染性。  
在极少数情况下，麻疹可能会致命。  
麻疹的传染性很强，90% 未接种疫苗人士一旦接触麻疹就会感染。



## 麻疹有哪些症状？

麻疹开始的症状时发烧，且发烧温度会非常高。可能出现的其他一些症状是：

- 咳嗽、流鼻涕和眼睛发红
- 微小的红色斑点皮疹（从头部开始）
- 腹泻
- 耳部感染

## 麻疹严重吗？

因麻疹住院的人数。  
麻疹可能很危险，尤其是对婴儿和幼儿。  
对于一些儿童来说，麻疹可导致：

- 肺炎（严重的肺部感染）
- 终生脑损伤
- 耳聋
- 死亡



五分之一的人  
将住院

## 麻疹是如何传播的？

- 当麻疹病毒感染者呼吸、咳嗽或打喷嚏时，麻疹就会传播。
- 它具有很强的传染性。
- 只要在麻疹患者去过的房间里且在其离开房间后的 2 小时内您去过该房间，您就可能会感染麻疹。
- 您甚至在感染者出现麻疹皮疹症状之前就可能被感染。
- 几乎所有没有接种过 MMR 疫苗人士如果接触麻疹病毒都会患上麻疹。



# 麻疹 情况说明书

医疗保健提供者建议儿童接种两剂 MMR 疫苗，作为预防麻疹、腮腺炎和风疹的最佳方法。

## 我的孩子应该什么时候接种 MMR 疫苗？

以下每个年龄段各一剂：

- 第一剂：12 - 15 个月
- 第二剂：4 - 6 岁
- 在前往另一个国家之前，6 至 11 个月的婴儿应接种 1 剂 MMR 疫苗。

## 为什么我的孩子应该接种 MMR 疫苗？

- 保护您的孩子免受麻疹（一种潜在的严重疾病）以及腮腺炎和风疹的侵害。
- 保护您的孩子免受因麻疹引起的不适皮疹和高烧。
- 避免使您的孩子无法去学校或托儿所，也避免使您无法工作。

## 疫苗的副作用是什么？

大多数儿童不会因注射疫苗而产生任何副作用。若确实出现副作用，则症状通常是轻微的，可能包括：

- 注射部位酸痛、发红或肿胀
- 发烧
- 轻度皮疹
- 关节暂时性疼痛和僵硬

更严重的副作用很少见。其中可能包括可导致癫痫发作的高烧。

## 遵循疫苗接种时间表

- 美国疾病控制与预防中心、美国家庭医生学会 (American Academy of Family Physicians) 和美国儿科学会 (American Academy of Pediatrics) 强烈建议儿童按照推荐的疫苗接种时间表接种所有疫苗。
- 根据年龄、健康状况和其他因素获取孩子可能需要的疫苗清单。
- 了解您应该遵循疫苗接种时间表的原因。

## MMR 疫苗是安全且有效的。

- 麻疹疫苗非常安全，可有效预防麻疹。与任何药物一样，疫苗也可能有副作用。这些副作用通常是轻微的且会自行消退。
- 美国和其他国家/地区的科学家已仔细研究了 MMR 疫苗。无人发现自闭症和 MMR 疫苗之间存在关联。

## 接种前、接种中和接种后

为孩子的疫苗接种就诊做好准备，并了解如何：

- 研究疫苗，并在就诊前为您的孩子做好准备
- 在就诊期间安慰您的孩子
- 接种后照顾您的孩子



Cook County  
DEPT. of  
Public Health

BUILDING  
HEALTHIER  
COMMUNITIES

