

نشرة معلومات الزيارة الأولى قبل الولادة

نبذة عن اختبار داء الزهري



Cook County
DEPT. of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



قد تُصابين بداء الزهري دون أن تظهر عليك أي أعراض.

لكن لا تقلقي، فمن الممكن علاجه باستخدام المضادات الحيوية.

يمكن أن يكون لداء الزهري الخُلقي آثار صحية كبيرة على جنينك.


يساعد إجراء الاختبار والخضوع للعلاج في أثناء الحمل على منع الإصابة بداء الزهري الخُلقي؛ أحد الأمراض المنقولة جنسياً (sexually transmitted infection, STI) الشائعة والقابلة للعلاج.

• يجب عليك إجراء اختبار الزهري عندما تصبحين حاملاً ثم في الثلث الثالث من الحمل للتأكد من عدم نقله إلى جنينك، حتى لو كنت قد أجريت الاختبار من قبل.

• قد تظهر عليك أعراض تشبه أعراض أمراض أخرى، أو قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق.

• يُرجى زيارة مقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك للحصول على رعاية ما قبل الولادة ولإجراء الاختبارات في أقرب وقت ممكن.

• يمكنك أيضاً البحث عن مواقع إجراء اختبار STI على موقع
• Get Tested التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) على الرابط [.gettested.cdc.gov](https://www.gettested.cdc.gov)



معرفة المزيد



نشرة معلومات الزيارة الأولى قبل الولادة
تحدثي مع مقدم الرعاية الصحية
حول اختبار داء الزهري



Cook County DEPT. of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



قد تُصابين بداء الزهري دون أن
تظهر عليك أي أعراض.
لكن لا تقلقي، فمن
الممكن علاجه باستخدام
المضادات الحيوية.

يمكن أن يكون لداء الزهري الخُلقي آثار صحية كبيرة على جنينك.

ينص القانون في ولاية إلينوي على أن يجري مقدم الرعاية الصحية اختبارًا لك
بحثًا عن داء الزهري في زيارتك الأولى قبل الولادة ومرة أخرى في الثلث الثالث
من الحمل.

**في زيارتك الأولى لمقدم الرعاية الصحية، اسألي طبيبك عن
إمكانية إجراء اختبار لداء الزهري.**

- يمكنك مناقشة الآتي في هذه الزيارة:
- أي أعراض جسدية جديدة أو غير عادية
 - أي أدوية أو عقاقير تستخدمينها
 - خطر تعدد شركاء الفراش
 - خطر الإصابة بداء الزهري في مجتمعك

إذا كانت نتيجة اختبار الزهري إيجابية، فسوف تحتاجين إلى العلاج
على الفور. ومن المهم أيضًا أن يحصل شريك الفراش على العلاج.
تابعي مع مقدم الرعاية الصحية للتأكد من نجاح علاجك.



معرفة المزيد



نشرة معلومات فترة ما قبل الحمل وفي أثناء الحمل

تقليل خطر الإصابة بداء الزهري



Cook County
DEPT of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



قد تُصابين بداء الزهري دون أن تظهر عليك أي أعراض.

لكن لا تقلقي، فمن الممكن علاجه باستخدام المضادات الحيوية.

يمكن أن يكون لداء الزهري الخُلقي آثار صحية كبيرة على جنينك.

الطريقة الوحيدة لتجنب الأمراض المنقولة جنسياً بشكل كامل؛ ومنها داء الزهري، هي عدم ممارسة الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي.

إذا كنتِ تمارسين الجنس، فيمكنك القيام بالآتي لتقليل فرص إصابتك بداء الزهري:

- أن تكون ممارسة الجنس في إطار علاقة طويلة الأمد مع شريك واحد خضع لاختبار الزهري وجاءت نتيجته سلبية.

- مطالبة الشريك باستخدام الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة في كل مرة تمارسون فيها الجنس، فالواقيات الذكرية تمنع انتشار داء الزهري عن طريق منع ملامسة القروح. لكن في بعض الأحيان تحدث القروح في مناطق لا يغطيها الواقي الذكري.

- اطلبي إجراء اختبار الزهري، وإذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، فسوف تحتاجين وشريكك إلى العلاج على الفور. تابعي مع مقدم الرعاية الصحية للتأكد من نجاح علاجك.



معرفة المزيد

