

Sobre las pruebas de sífilis



Es posible contraer sífilis y no saberlo.

La sífilis se puede tratar con antibióticos.

La sífilis congénita puede tener consecuencias importantes para la salud de su bebé.

Hacerse pruebas y tratarse durante el embarazo pueden prevenir la sífilis congénita, una infección de transmisión sexual (STI) frecuente y tratable.

- Incluso si se hizo la prueba antes, debe volver a hacerse la prueba de sífilis cuando quede embarazada y nuevamente en el tercer trimestre para asegurarse de no transmitirle la enfermedad a su bebé.
- Es posible que tenga síntomas que imiten a otras enfermedades o que no tenga síntomas en absoluto.
- Consulte a su proveedor de atención médica para recibir atención prenatal y hacerse la prueba lo antes posible.
- También puede buscar lugares donde hacen pruebas de STI en el sitio web Get Tested de los CDC en gettested.cdc.gov.



MÁS INFORMACIÓN



Hable con su proveedor sobre las pruebas de sífilis



Cook County DEPT. of Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



Es posible contraer sífilis y no saberlo.

La sífilis se puede tratar con antibióticos.

La sífilis congénita puede tener consecuencias importantes para la salud de su bebé.

En Illinois, su proveedor ESTÁ OBLIGADO por ley a hacerle una prueba de sífilis en su primera visita prenatal y nuevamente en su tercer trimestre.

En su primera visita de atención médica, pregúntele a su proveedor sobre la posibilidad de hacerse una prueba de sífilis.

En esta visita, podrá hablar sobre:

- Síntomas físicos nuevos o inusuales
- Drogas o medicamentos que esté tomando
- Nuevas o múltiples parejas sexuales
- El riesgo de sífilis en su comunidad

Si el resultado de la prueba de sífilis da positivo, deberá tratarse de inmediato. También es importante que su(s) pareja(s) sexual(es) reciba(n) tratamiento. Haga un seguimiento con su proveedor de atención médica para asegurarse de que su tratamiento haya sido exitoso.



MÁS INFORMACIÓN



Reduzca el riesgo de contraer sífilis



Cook County
DEPT
of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



Es posible contraer sífilis y no saberlo.

La sífilis se puede tratar con antibióticos.

La sífilis congénita puede tener consecuencias importantes para la salud de su bebé.

La única forma de evitar por completo las infecciones de transmisión sexual, incluida la sífilis, es no teniendo relaciones sexuales vaginales, anales u orales.

Si es sexualmente activa, puede hacer lo siguiente para reducir sus probabilidades de contraer sífilis:

- Estar en una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja que se haya hecho la prueba de sífilis y no tenga sífilis.
- Usar condones de manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales. Los condones previenen la propagación de la sífilis al evitar el contacto con las llagas. A veces aparecen llagas en zonas que no están cubiertas por el condón.
- Hágase la prueba de sífilis. Si el resultado de la prueba de sífilis da positivo, usted y su(s) pareja(s) necesitarán tratarse de inmediato. Haga un seguimiento con su proveedor de atención médica para asegurarse de que su tratamiento haya sido exitoso.



MÁS INFORMACIÓN

