

Informacje o testach na kiłę



Cook County
DEPT. of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



Można zarazić się kiłą i nie wiedzieć o tym.

Kiłę można leczyć antybiotykami.

Kiła wrodzona może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla Twojego dziecka.

Badania i leczenie w czasie ciąży mogą zapobiec kile wrodzonej, powszechnej i możliwej do wyleczenia chorobie przenoszonej drogą płciową (sexually transmitted infection, STI).

- Nawet jeśli już wcześniej poddałaś się testowi na kiłę, powinnaś poddać się testowi ponownie, gdy zajdziesz w ciążę oraz ponownie w trzecim trymestrze, aby mieć pewność, że nie zarazisz swojego dziecka.
- Mogą u Ciebie wystąpić objawy przypominające inne choroby lub w ogóle nie występować.
- Skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby uzyskać opiekę prenatalną i jak najszybciej wykonać badania.
- Można również wyszukać placówki wykonujące testy na STI na stronie internetowej Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) Get Tested pod adresem [gettested.cdc.gov](https://www.gettested.cdc.gov).



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Porozmawiaj ze swoim lekarzem o testach na kiłę



Cook County
DEPT.
of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



Można zarazić się kiłą i nie wiedzieć o tym.

Kiłę można leczyć antybiotykami.

Kiła wrodzona może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla Twojego dziecka.

W stanie Illinois lekarz ma **OBOWIĄZEK** wykonać u pacjentki test na obecność kiły podczas pierwszej wizyty prenatalnej oraz ponownie w trzecim trymestrze ciąży.

Podczas pierwszej wizyty u lekarza zapytaj go o możliwość wykonania testu na kiłę.

Podczas tej wizyty możesz omówić:

- Jakiegokolwiek nowe lub nietypowe objawy fizyczne
- Jakiegokolwiek leki lub medykamenty, które stosujesz
- Nowych lub wielokrotnych partnerów seksualnych
- Ryzyko wystąpienia kiły w Twojej społeczności

Jeśli wynik testu na kiłę będzie pozytywny, konieczne będzie natychmiastowe leczenie. Ważne jest również, aby Twój partner(z) seksualny(i) poddali się leczeniu. Skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby upewnić się, czy leczenie było skuteczne.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Zmniejsz ryzyko zachorowania na kiłę



Cook County
DEPT
of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



Można zarazić się kiłą i nie wiedzieć o tym.

Kiłę można leczyć antybiotykami.

Kiła wrodzona może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla Twojego dziecka.

Jedynym sposobem całkowitego uniknięcia chorób przenoszonych drogą płciową, w tym kiły, jest powstrzymanie się od seksu waginalnego, analnego i oralnego.

Jeśli jesteś osobą aktywną seksualnie, możesz podjąć następujące działania, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na kiłę:

- Pozostawać w długotrwałym, monogamicznym związku z partnerem, u którego wykonano test na kiłę i u którego stwierdzono brak kiły.
- Za każdym razem, gdy uprawiasz seks, używaj prezerwatyw we właściwy sposób. Prezerwatywy zapobiegają rozprzestrzenianiu się kiły, uniemożliwiając kontakt z ranami. Czasami rany pojawiają się w miejscach nieosłoniętych prezerwatywą.
- Zrób test na kiłę. Jeśli wynik testu na kiłę będzie pozytywny, Ty i Twój partner(zy) będziecie potrzebowali natychmiastowego leczenia. Skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby upewnić się, że leczenie jest skuteczne.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

