



感染梅毒而不自知是有可能的。

**梅毒可以用抗生素治疗**

**先天性梅毒会对宝宝健康造成严重影响。**

在怀孕期间进行检测和治疗可以预防先天性梅毒，这是一种常见且可治愈的性传播感染 (sexually transmitted infection, STI)。

- 即使您之前已经做过检测，怀孕时以及妊娠晚期仍应再次接受梅毒检测，以确保不会将其传染给您的宝宝。
- 您可能会有类似其他疾病的症状，或者可能根本没有症状。
- 请尽快就医，进行产前护理和检测。
- 您也可以在美国疾病控制与预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 的 Get Tested 网站 ([gettested.cdc.gov](http://gettested.cdc.gov)) 上搜索 STI 检测站点。



了解更多



首次产前检查须知

# 与您的医疗服务提供者讨论 梅毒检测



Cook County DEPT. of  
Public Health

**BUILDING**  
**HEALTHIER**  
**COMMUNITIES**



感染梅毒而不自知是有可能的。

## 梅毒可以用抗生素治疗

**先天性梅毒会对宝宝健康造成严重影响。**

在伊利诺伊州，法律要求您的医疗服务提供者在您第一次产前检查时检测梅毒，并在妊娠晚期再次检测。

**在您第一次就诊时，请向您的医疗服务提供者询问是否可以  
进行梅毒检测。**

此次就诊中，您可以讨论：

- 任何新的或不寻常的身体症状
- 您正在使用的任何药物或药品
- 新的或多个性伴侣
- 您所在社区的梅毒风险

如果梅毒检测呈阳性，则需要立即接受治疗。您的性伴侣同样需要治疗，这一点非常重要。请您的医疗服务提供者进行后续联系，以确保治疗效果良好。



了解更多



怀孕前及怀孕期间须知

# 降低感染梅毒的风险



Cook County  
DEPT of  
Public Health

**BUILDING**  
**HEALTHIER**  
**COMMUNITIES**



感染梅毒而不自知是有可能的。

## 梅毒可以用抗生素治疗

**先天性梅毒会对宝宝健康造成严重影响。**

完全避免性传播感染（包括梅毒）的唯一方法是不进行阴道性交、肛门性交或口交。

**如果您有性生活，可以采取以下措施来降低感染梅毒的风险：**

- 与经过梅毒检测且未患有梅毒的伴侣保持长期相互专一的关系。
- 每次性交时都要正确使用避孕套。避孕套可以防止接触溃疡，从而防止梅毒的传播。有时，溃疡会出现在避孕套未覆盖的部位。
- 接受梅毒检测。如果您的梅毒检测呈阳性，您和您的伴侣将需要立即接受治疗。请您的医疗服务提供者进行后续联系，以确保治疗效果良好。



了解更多

