

Что такое коклюш?

Коклюш — крайне заразное респираторное заболевание, которое может вызывать серьезные, а иногда и смертельные осложнения у младенцев и детей младшего возраста.

У младенцев и детей, которым не были сделаны все рекомендуемые прививки от коклюша, выше вероятность возникновения серьезных осложнений, которые могут потребовать госпитализации.



1 из 3

детей в возрасте до 1 года госпитализируются с коклюшем.



Как распространяется коклюш?

Коклюш распространяется через кашель и чихание. У некоторых людей симптомы проявляются менее выраженно, они не знают, что у них коклюш, и неосознанно заражают других.

Многие дети, заболевавшие коклюшем, случайно заражаются от старших братьев и сестер, родителей или лиц, осуществляющих уход.

Каковы симптомы коклюша?

Симптомы обычно проявляются через 5–10 дней после заражения, но могут проявиться и через 21 день.

Ранние симптомы коклюша в первые две недели часто похожи на симптомы простуды и могут включать:

- Насморк или заложенность носа
- Субфебрильная температура (ниже 38°C / 100,4°F)
- Легкий, периодический кашель

Более поздние симптомы могут длиться от одной до шести недель и включают:

- Сильные приступы кашля, особенно ночью
- Пронзительный свист после приступа кашля
- Рвота после кашля



О коклюше (продолжение)

Как лечится коклюш?

- Врачи обычно лечат коклюш антибиотиками.
- Людям, которые вступают в тесный контакт с больным коклюшем, также следует принимать антибиотики.

Примечание: Пациентам следует оставаться дома во время приема антибиотиков от коклюша.

Как я могу защитить свою семью и общество?

- Организуйте ежегодные медицинские осмотры вашего ребенка.
- Сделайте рекомендуемые прививки.
- Прикрывайте рот и нос при кашле и чихании.
- Чаще мойте руки.
- Если вы заболели, оставайтесь дома и не ходите на работу или на учебу.

Людям всех возрастов необходимы прививки от коклюша.



DTaP

Для маленьких детей

- ✓ 2, 4 и 6 месяцев
- ✓ 15–18 месяцев
- ✓ 4–10 лет

Tdap

Для предподросткового возраста

- ✓ 11–12 лет

Tdap

Для беременных женщин

- ✓ В период 27—36 недель каждой беременности

Tdap

Для взрослых

- ✓ В любое время для тех, кто никогда не получал прививки

www.cdc.gov/whoopingcough



Родители. Если вы считаете, что у вашего ребенка или других членов вашей семьи коклюш, немедленно обратитесь к врачу.

Медицинские учреждения. Сообщите о возможных случаях коклюша в Департамент общественного здравоохранения округа Кук (Department of Public Health) по **телефону 708-836-8699** в течение 24 часов.

Дополнительная информация:

- Коклюш: bit.ly/about-pertussis
- Все рекомендуемые вакцины: boostupcookcounty.com

