

Zmniejsz ryzyko zachorowania na kiłę



Cook County
DEPT
of
Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES



Można zarazić się kiłą i nie wiedzieć o tym.

Kiłę można leczyć antybiotykami.

Kiła wrodzona może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla Twojego dziecka.

Jedynym sposobem całkowitego uniknięcia chorób przenoszonych drogą płciową, w tym kiły, jest powstrzymanie się od seksu waginalnego, analnego i oralnego.

Jeśli jesteś osobą aktywną seksualnie, możesz podjąć następujące działania, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na kiłę:

- Pozostawać w długotrwałym, monogamicznym związku z partnerem, u którego wykonano test na kiłę i u którego stwierdzono brak kiły.
- Za każdym razem, gdy uprawiasz seks, używaj prezerwatyw we właściwy sposób. Prezerwatywy zapobiegają rozprzestrzenianiu się kiły, uniemożliwiając kontakt z ranami. Czasami rany pojawiają się w miejscach nieosłoniętych prezerwatywą.
- Zrób test na kiłę. Jeśli wynik testu na kiłę będzie pozytywny, Ty i Twój partner(zy) będziecie potrzebowali natychmiastowego leczenia. Skontaktuj się ze swoim lekarzem, aby upewnić się, że leczenie jest skuteczne.



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

