



首席护士

10个事实



关于麻疹的

1

麻疹具有高度传染性。

10个未接种疫苗的人中，有9个在接触麻疹病毒后会被感染。

2

MMR疫苗是预防麻疹的最佳方式。

两剂MMR疫苗对预防麻疹的有效率为97%。

3

群体免疫保护整个社区。

当社区中超过95%的人接种疫苗时，可以保护所有人，包括那些太小不能接种疫苗的婴儿。

4

麻疹疫苗接种率在下降。

97%的麻疹病例发生在未接种疫苗的人群中。

5

麻疹疫苗 (MMR) 安全且有效。

麻疹疫苗已使用超过50年，全球挽救了大约6000万条生命。

6

麻疹疫苗的副作用风险较低。

大多数副作用，如手臂酸痛或低烧，都是轻微和短暂的。

7

MMR疫苗不会导致自闭症。

大量研究表明MMR疫苗与自闭症之间无关联。

8

麻疹可能导致严重并发症。

它可能引发肺炎、脑肿胀、妊娠并发症，甚至死亡（尤其在幼儿中）。

9

每5名麻疹患者中有1人需要住院治疗。

2024年，麻疹的住院率更高，每5名美国患者中就有2人住院。

10

维生素A不能预防或治愈麻疹。

它可能减轻维生素A缺乏者严重麻疹的症状。

麻疹正在传播。它是可以预防的。



Cook County DEPT. of Public Health

BUILDING HEALTHIER COMMUNITIES

了解真相。



健康教育者



你可以做的5件事

保护你和家人免受麻疹侵害

1 检查你的免疫状态。

确保你已完整接种两剂MMR疫苗。

如果你不确定，请联系你的医疗服务提供者，或访问伊利诺伊州公共卫生部的Vax Verify网站：

dph.illinois.gov/vaxverify.html

如果你在1963年至1967年之间接种过疫苗，请与医疗服务提供者确认是否需要重新接种。

如果你出生于1957年前，通常认为你曾接触过麻疹。验血可以确认你的免疫状态。

2 接种疫苗。

请联系你的医疗服务提供者安排麻疹疫苗接种。如果你没有医疗服务提供者，请致电 Cook County Health，电话：312-864-1111，预约免费麻疹疫苗接种。

3 留意症状。

麻疹症状可能在接触后21天出现，包括：

- 皮疹
- 高烧
- 咳嗽
- 流鼻涕
- 红眼流泪

4 如果生病，请待在家中。

如果你感到不适，请待在家中。在前往医疗服务机构或急诊室前请先致电，以保护他人免受感染。

5 保持信息更新。

扫描下方二维码获取更多信息。

麻疹正在传播。
它是可以预防的。

了解真相。



Cook County DEPT. of Public Health

BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES