

ACERCA DE LA CLAMIDIA

¿Qué es la clamidia?

La clamidia es una infección de transmisión sexual (ITS) común que afecta a personas de todos los géneros y edades. Tener una ITS no define quién es usted, y hacerse la prueba y recibir tratamiento es una parte normal del cuidado de la salud.

¿Cómo se propaga la clamidia?

- Se propaga por medio de relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una pareja infectada.
- Puede propagarse por contacto genital cercano, incluso sin penetración.
- A menudo no presenta síntomas, por lo que las personas pueden propagarla sin saberlo.
- La infección puede ocurrir en otras áreas del cuerpo (vagina, ano, garganta) dependiendo de la actividad sexual.
- Dígle a su médico qué tipos de relaciones sexuales tiene para que se puedan examinar todas las áreas necesarias.

Hágase la prueba

- La prueba es sencilla: por lo general requiere un análisis de orina, pero también podría incluir hisopados vaginales, genitales, rectales y/o de garganta.
- Se recomiendan pruebas de detección regulares, especialmente para personas sexualmente activas menores de 25 años o cualquier persona con parejas nuevas o múltiples.
- Sea sincero con su proveedor de atención médica sobre sus actividades sexuales para que pueda examinar todas las áreas relevantes.

Obtenga Pruebas y Condones Gratis

Encuentre sitios de pruebas en Cook County



Solicite condones gratis



Cook County DEPT. of
Public Health

A division of Cook County Health

**BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES**

Signos y síntomas

Si tiene vagina, preste atención a:

- Flujo u olor vaginal inusual
- Sangrado entre períodos o después de tener relaciones sexuales
- Dolor o ardor al orinar
- Dolor pélvico o abdominal, a veces con fiebre o náuseas

Si tiene pene, preste atención a:

- Secreción transparente o blanca del pene
- Dolor o ardor al orinar
- Testículos hinchados o sensibles

Todos los géneros, presten atención a:

- Dolor, secreción o sangrado del ano
- Dolor de garganta (si la infección está en la garganta)

Por qué es importante el tratamiento

Sin tratamiento, la clamidia puede causar:

- Dolor pélvico continuo
- Problemas de fertilidad
- Complicaciones durante el embarazo o transmisión de la infección a un bebé durante el parto
- Mayor riesgo de contraer o transmitir otras ITS, incluido el VIH

Reciba tratamiento

- La clamidia se trata fácilmente con antibióticos.
- Es importante tomar todos los medicamentos según lo recetado, incluso si se siente bien.
- Sus parejas sexuales también necesitan pruebas y tratamiento para prevenir la reinfección.



Tener una ITS no lo define.

Hacerse la prueba y recibir tratamiento son una parte normal de la atención médica.

Protéjase y proteja a los demás

- Use condones o barreras dentales durante el sexo vaginal, anal y oral.
- Hágase la prueba regularmente y anime a sus parejas a hacer lo mismo.
- Hable abiertamente con sus parejas y su médico sobre la prevención de las ITS: es parte de una comunicación saludable.
- Pregunte a su médico sobre opciones adicionales de protección y prevención, como la terapia acelerada para parejas (EPT), Doxy-PEP, PrEP o nPEP, que pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas infecciones, incluido el VIH.
- Evite el contacto sexual hasta que usted y su(s) pareja(s) hayan completado el tratamiento.

Si su prueba da positivo

Si los resultados de su prueba son positivos, su médico debe informarlo al departamento de salud. Esto nos ayuda a comunicarnos con los pacientes para asegurarnos de que reciban tratamiento para su infección y evitar que las infecciones se propaguen en la comunidad.

Su información personal está protegida por las regulaciones de HIPAA y todo lo que comparta se mantiene estrictamente confidencial.

Puede recibir una llamada nuestra para:

- Asegurar que haya recibido el tratamiento adecuado
- Darle más información
- Recopilar un breve historial sexual y un posible cronograma de exposición
- Ayudar a evitar que la infección se propague en la comunidad.