

ACERCA DE LA GONORREA



¿Qué es la gonorrea?

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) común que afecta a personas de todos los géneros y edades. Tener una ITS no lo define; hacerse la prueba y recibir tratamiento es simplemente parte de cuidar su salud general.

¿Cómo se propaga la gonorrea?

- La gonorrea se transmite por sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene la infección.
- Puede propagarse incluso sin penetración completa, por contacto genital cercano.
- Las personas pueden tener gonorrea sin saberlo; muchas no notan los síntomas.
- La gonorrea puede infectar diferentes partes del cuerpo: el área vaginal, el pene, el ano, la garganta o los ojos.
- Las infecciones de gonorrea no tratadas o mal tratadas pueden avanzar a una condición más grave en la que las bacterias entran al torrente sanguíneo y causan una enfermedad grave, llamada Infección Gonocócica Diseminada (DGI).

Hágase la prueba

- La prueba es simple: por lo general, un análisis de orina y/o un hisopado vaginal, del recto y/o de la garganta.
- Se recomiendan pruebas de detección regulares, especialmente para personas sexualmente activas menores de 25 años o cualquier persona con parejas nuevas o múltiples.
- Sea sincero con su proveedor de atención médica sobre sus actividades sexuales para que pueda examinar todas las áreas relevantes.

Obtenga Pruebas y Condones Gratis

Encuentre sitios de pruebas en Cook County



Solicite condones gratis



Cook County DEPT. of
Public Health

A division of Cook County Health

**BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES**

Signos y síntomas

La mayoría de las personas no tienen síntomas, por lo que es importante hacerse pruebas regulares. Cuando aparecen, por lo general se presentan 1–14 días después de la exposición.

Si tiene vagina, preste atención a:

- Secreción vaginal espesa de color amarillo o gris
- Ardor o dolor al orinar o defecar
- Sangrado entre períodos o después de tener relaciones sexuales
- Cólicos o dolor en la parte inferior del abdomen

Si tiene pene, preste atención a:

- Secreción espesa de color amarillo o verdoso del pene
- Ardor o dolor al orinar o defecar
- Necesidad de orinar con más frecuencia
- Testículos hinchados o sensibles


Todos los géneros, presten atención a:

- Dolor, secreción o sangrado anal
- Dolor de garganta (si la infección está en la garganta)
- Dolor o secreción en los ojos (poco frecuente)

Por qué es importante el tratamiento

Sin tratamiento, la gonorrea puede causar:

- Dolor pélvico a largo plazo
- Problemas de fertilidad en todos los géneros
- Complicaciones durante el embarazo o transmisión de la infección a un bebé durante el parto
- Daño a los órganos reproductores
- Problemas cardíacos, enfermedad de la piel, artritis
- Mayor riesgo de contraer o transmitir otras ITS, incluido el VIH



Reciba tratamiento

- La gonorrea se trata con antibióticos recetados por un proveedor de atención médica.
- Es importante terminar todos los medicamentos según las indicaciones.
- Las parejas sexuales también deben hacerse la prueba y recibir tratamiento para prevenir la reinfección.

Gonorrea resistente a los antibióticos

Aunque la gonorrea actualmente se puede tratar con los antibióticos recomendados, tiene un largo historial de adquirir resistencia a los antibióticos. La resistencia a la clase actual de antibióticos usados para tratar la gonorrea está aumentando a nivel mundial. La gonorrea resistente sigue siendo rara en los Estados Unidos, pero es importante volver a comunicarse con su médico si los síntomas no desaparecen o empeoran después de recibir tratamiento para la gonorrea. Su médico puede hacer una prueba de curación y conectarlo con atención si la infección no ha desaparecido por completo.

Protéjase y proteja a los demás

- Use condones o barreras dentales durante el sexo vaginal, anal y oral.
- Hágase la prueba regularmente y anime a sus parejas a hacer lo mismo.
- Hacerse la prueba de nuevo 1–2 semanas después del tratamiento puede ayudar a asegurar que la infección se curó y que no tiene una infección resistente a los antibióticos o una que pueda avanzar a DGI.
- Hable abiertamente con sus parejas y su médico sobre la prevención de las ITS: es parte de una comunicación saludable.
- Pregunte a su médico sobre opciones adicionales de protección y prevención, como la terapia acelerada para parejas (EPT), Doxy-PEP, PrEP o nPEP, que pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas infecciones, incluido el VIH.
- Evite el contacto sexual hasta que usted y su(s) pareja(s) hayan completado el tratamiento.

Seguimiento de ITS de notificación obligatoria

La mayoría de las infecciones por ITS, incluida la gonorrea, son de notificación obligatoria. Esto significa que es probable que el personal del departamento de salud se comunique con usted si sus resultados de la prueba son positivos. Lo hacen para:

- Asegurar que haya recibido el tratamiento adecuado
- Darle información completa
- Recopilar un breve historial sexual y un posible cronograma de exposición
- Ayudar a detener la propagación de la infección en la comunidad

Su información personal está protegida por las normas de HIPAA, y todo lo que comparta es completamente confidencial.