

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una infección de transmisión sexual (STI) que puede afectar a personas de todos los géneros y edades. Se desarrolla en etapas y puede causar problemas graves de salud si no se trata.

Cómo se propaga la sífilis

- La sífilis se transmite a través del sexo vaginal, anal u oral, y a veces a través del contacto genital cercano con alguien que tiene sífilis.
- También puede propagarse de una persona embarazada a su bebé durante el embarazo o el parto (esto se llama sífilis congénita).
- La sífilis puede afectar múltiples partes del cuerpo, incluidos los genitales, la boca, el ano y otros órganos si no se trata. También puede afectar el sistema nervioso central, los ojos o los oídos en cualquier etapa de la infección. La sífilis no tratada o tratada de forma inadecuada aumenta el riesgo de estas complicaciones.

Hágase la prueba

- La prueba se hace a través de un simple análisis de sangre y, en algunos casos, un hisopado de las llagas.
- Debido a que los signos de la sífilis, como una llaga, a veces pueden aparecer internamente (genitales o recto), también puede ser necesario que su proveedor haga un examen físico.
- Illinois requiere que los proveedores de atención médica hagan pruebas de detección de sífilis a las pacientes embarazadas en la primera visita prenatal y nuevamente durante el tercer trimestre.
- Se recomiendan pruebas de detección regulares para quienes tienen parejas nuevas o múltiples, personas embarazadas o cualquier persona expuesta a la sífilis.
- Se recomiendan pruebas de detección regulares, especialmente para personas sexualmente activas menores de 25 años o cualquier persona con parejas nuevas o múltiples.



Reciba tratamiento

- La sífilis se trata con antibióticos (generalmente penicilina).
- El tratamiento temprano es muy efectivo, pero el daño pasado no se puede revertir.
- Todas las parejas sexuales recientes deben hacerse la prueba y recibir tratamiento para prevenir la reinfección.

Por qué es importante el tratamiento

- La sífilis no tratada o tratada de forma inadecuada puede causar daño permanente a los órganos, problemas neurológicos, enfermedades cardíacas y la muerte.
- Tratar la sífilis a tiempo previene problemas de salud a largo plazo y detiene el contagio a las parejas y a los bebés durante el embarazo.

Obtenga Pruebas y Condones Gratis

Encuentre sitios de pruebas en Cook County



Solicite condones gratis



ACERCA DE LA SÍFILIS



Cook County DEPT. of
Public Health

A division of Cook County Health

**BUILDING
HEALTHIER
COMMUNITIES**

Etapas y síntomas

Es posible que no note o no tenga síntomas. A esto se le llama ser asintomático.

1.ª etapa: Sífilis primaria

- Los síntomas aparecen 1–12 semanas después de la exposición.
- Se forma una llaga sin dolor (llamada chancro) en los genitales, la boca o el ano. Puede aparecer un chancro de forma interna en los genitales, el cual podría pasar desapercibido durante las pruebas.
- La llaga dura 2–6 semanas y sana por sí sola, pero la infección permanece en el cuerpo.
- Esta es una de las etapas más infecciosas y transmisibles de la sífilis.

2.ª etapa: Sífilis secundaria

- Puede aparecer un sarpullido en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, no causa picazón. Algunas personas también pueden tener llagas en la boca en esta etapa.
- Pueden presentarse síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre, ganglios linfáticos inflamados o fatiga.
- El sarpullido y los síntomas parecidos a los de la gripe pueden desaparecer, pero la sífilis sigue presente.
- Esta es una de las etapas más infecciosas y transmisibles de la sífilis.

Etapas latente y tardía

- Sin tratamiento o cuando el tratamiento no es adecuado, la sífilis puede entrar en una fase larga y oculta (latente). Es menos probable que la sífilis se transmita a las parejas sexuales en esta etapa, pero puede causar complicaciones de salud a largo plazo.
- Si no se trata, puede causar daños graves en el corazón, el cerebro, los nervios y otros órganos.
- La sífilis en etapa tardía puede causar ceguera, parálisis, demencia y la muerte.

Tener una ITS no define quién es usted.

Hacerse la prueba y recibir tratamiento son una parte normal de la atención médica.

Sobre la sífilis congénita

- Si la sífilis no se trata o se trata de forma inadecuada durante el embarazo, puede transmitirse al bebé antes del nacimiento.
- Puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o infecciones graves que ponen en peligro la vida del recién nacido.
- Los bebés con sífilis congénita pueden tener deformidades óseas, anemia, agrandamiento del hígado y del bazo, problemas en el cerebro y los nervios, y retrasos en el desarrollo.
- Las pruebas y el tratamiento prenatales tempranos, además de hacer pruebas al recién nacido después del parto, son esenciales para proteger tanto al progenitor como al bebé.

Protéjase y proteja a los demás

- Use condones o barreras dentales durante el sexo vaginal, anal y oral.
- Hágase la prueba regularmente y anime a sus parejas a hacer lo mismo.
- Hable abiertamente con sus parejas y su médico sobre la prevención de las ITS: es parte de una comunicación saludable.
- Pregunte a su médico sobre opciones adicionales de protección y prevención, como la terapia acelerada para parejas (EPT), Doxy PEP, PrEP o PEP, que pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas infecciones, incluido el VIH.
- Evite el contacto sexual hasta que usted y su(s) pareja(s) hayan completado el tratamiento.

Seguimiento de ITS de notificación obligatoria

La mayoría de las infecciones de transmisión sexual (STI), incluida la sífilis, son infecciones de notificación obligatoria. Esto significa que es probable que el personal del departamento de salud se comunique con usted si sus resultados de la prueba son positivos. Lo hacen para:

- Asegurar que haya recibido el tratamiento adecuado
- Darle información completa
- Recopilar un breve historial sexual y un posible cronograma de exposición
- Ayudar a detener la propagación de la infección en la comunidad

Su información personal está protegida por las normas de HIPAA, y todo lo que comparta es completamente confidencial.

